


ЗАПАЛЬНІ ХВОРОБИ ВУХА

Доповідач д. мед. н., професор
кафедри отоларингології з
офтальмологією ПДМУ


Гасюк Юрій Анатолійович



BYXO




БАРАБАННА ПЕРЕТИНКА



ЗОВНІШНІЙ ОТИТ



Отомікоз



ГОСТРИЙ ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ

Етіологія – патогенна вірусна (віруси грипу, парагрипу, аденовірусні інфекції) та бактеріальна мікрофлора (частіше – кокова мікрофлора).

Патогенез – зниження опірності організму.

Шляхи проникнення інфекції у середнє вухо:

- рино-тубарний шлях;
- через зовнішній слуховий прохід (травма барабанної перетинки);
- гематогенний шлях.

стан носа та носоглотки (аденоїди, аденоїдит, гіпертрофічний риніт, викривлення перегородки носа, гнійні синуїти, хірургічні втручання в порожнині носа та носоглотки, передня або задня тампонада носа)

структура сосковидного відростка (пневматичний, діплоетичний, склеротичний)

КЛІНІЧНА КАРТИНА



I стадія – доперфоративна

II стадія – перфоративна

III стадія – репаративна



ГОСТРИЙ ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ І СТ.



Мастоїдит

```
graph TD; A[Мастоїдит] --> B[первинний]; A --> C[вторинний];
```

первинний

травма
соскоподібного
відростка,
гематогенний заніс,
сифіліс, туберкульоз

вторинний

ускладнення гнійного
середнього отиту,
загострення гнійного
середнього отиту

Мастоїдит



Атипові форми мастоїдиту:

- Зигоматицит
 - Верхівково-шийний (Бецольдівський)
 - Чітеллі
 - Скваміт
 - Петрозит
 - Антрит (отоантрит)
- 

Хронічний отит



мезотимпаніт






епітимпаніт



Діагностичні ознаки	Хронічний мезотимпаніт	Хронічний епітимпаніт
Локалізація процесу в барабанній порожнині	Середній і нижній відділи	Всі відділи з переважною локалізацією у верхньому (атику)
Глибина поширення процесу	Слизова оболонка	Слизова оболонка і кісткові структури
Скарги хворого	Гноетеча з вуха, зниження слуху, може бути відчуття шуму у вусі	Гноетеча з вуха, зниження слуху, може бути відчуття шуму у вусі. Нерідко - головний біль, запаморочення
Характер виділень	Слизове або слизово-гнійне, без запаху	Гнійне, із запахом
Тип перфорації	Колова (центральна)	Крайова
Патологічний вміст у барабанній порожнині	Гній, грануляції, поліпи	Гній, грануляції, поліпи, холестеатома
Характер глухуватості	Басова	Змішана з переваженням басової
Рентгенографія скроневи́х кісток	Склерозування	Склерозування, ділянок розрідження і деструкції в атикоантральній ділянці

Мезотимпаніт




Епітимпаніт



Епітимпаніт



Епітимпаніт



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

